

42 N 13

1836

Lane Medical Library

Ueber den

ahren Blutschwamm des Auges

und seine Verschiedenheit

von

anderen ähnlichen Krankheiten.

Inauguralabhandlung

von

Conrad Heinrich Adolph Funke,

Doktor der Medicin und Chirurgie, aus Braunschweig.

Mit einer illuminirten Kupfertafel.

Erlangen 1836.

Druck der Kunstmann'schen Universitäts-Buchdruckerei.

nen klinischen Vorträgen bei verschiedenen Gelegenheiten über die in Rede stehende Krankheit, ihre Aehnlichkeit, oder Verschiedenheit von anderen bemerkte, und was ich aus meinem klinischen Tagebuche auszog. Wenn es mir auch nicht gelungen ist, Alles dieses genau und vollständig wiederzugeben, so möchte doch die mir von Herrn Professor J ä g e r auf meinen Wunsch mitgetheilte Abbildung eines von ihm beobachteten Falles Manchem nicht uninteressant seyn. Möchte diese kleine Schrift die Veranlassung werden, daß andere Augenärzte ihre etwaigen Beobachtungen ähnlicher Art der gelehrten Welt mittheilten und daß es dem eben so thätigen, als geistreichen Herausgeber der Zeitschrift für Ophthalmologie, Herrn Professor v. A m m o n, gefiele, dieses Thema zur Sprache zu bringen und das von mir nicht Geleistete zu ersetzen, um so mehr, da die Handbücher über Ophthalmologie diesen Punkt noch wenig berücksichtigt haben.

§. 1.

Zu den seltensten bisher beobachteten Augenkrankheiten gehört ohne Zweifel der Blutschwamm. Sowohl die älteren, als auch die neueren Handbücher führen ihn daher nicht besonders an, sondern nur in Verbindung mit dem Markschwamme. Allein nach den Beobachtungen von Boyer, v. Walther, Heusinger und Herrn Professor Jäger giebt es ein schwammiges neues Gebilde, das sich wesentlich von dem bisher beobachteten Carcinoma (Scirrhus), Fungus medullaris, Fungus melanoticus auf der einen Seite, so wie auf der anderen von der angeborenen und von der erworbenen Erweiterung der Capillargefäße (Angiektasia et Fungi) unterscheidet. Mit diesen letztgenannten Krankheiten hat man den Blutschwamm am häufigsten verwechselt, weil sie in ihrem Verlaufe einige Aehnlichkeit mit ihm haben. Bevor ich zur Diagnose des Blutschwammes überhaupt und namentlich zu der des Auges insbesondere übergehe, muß ich zuerst eine kurze Charakteristik der anderen ihm ähnlichen Krankheiten geben:

§. 2.

1. Angiektasia.

Die Angiektasia (Aneurisma per anastomosin, Tumor vasculosus, Naevus maternus subcutaneus sive

vasculosus) ist eine entweder angeborene, oder später erworbene Erweiterung der Haargefäße der Haut und des Unterhautzellengewebes, besonders an den Uebergangsstellen in die Schleimhäute. Diese Erweiterung hat viel Aehnlichkeit mit dem Mutterkuchen, oder mit der Milz, besteht aus grossen Gefäßconvoluten und Bluthöhlen, gleich dem sogenannten erectilen Gewebe, ohne daß das Blut in besondere Kisten abgesondert wird, daselbst gerinnt, oder zur Entzündung und Verschwärung der Haut, zum Umsichfressen, zur Umwandlung in ein bösartiges Geschwür, oder gar zum Auftreten an verschiedenen Stellen des Körpers mit einer allgemeinen Säfteentmischung (Dyskrasie) eine Neigung hat. Im Gegentheile ist die genannte Krankheit eine rein locale, durch einen Fehler des Bildungstriebes, oder durch einen äusseren mechanisch-chemisch-dynamischen Reiz entstandene Erweiterung der sogenannten Capillargefäße, zu deutlich sichtbaren Arterien und Venen gebildet, also eine eigentliche Hypertrophie. Nach dem ursprünglich anatomischen Baue des Gewebes, in dem sie auftreten, führen diese Gefäße bald mehr arterielles, bald mehr venöses Blut, was sich durch die mehr hell-, oder dunkelrothe Farbe, durch feinere, oder dickere Stränge zu erkennen giebt; woher man sehr zweckmäfsig die Angiektasle in eine arterielle und venöse eintheilt. Daß diese Gefäßerweiterung nicht blos angeboren ist, sondern auch durch chronische Reizung und Entzündung, besonders aber durch rheumatische Ursachen hervorgebracht werden kann und nicht blos in der Cutis, sondern auch in Schleim- und fibrösen Häuten

und drüsigen Organen vorkommt, zeigt die aufmerksame Beobachtung. Es ist fast unmöglich, den wahren Blutschwamm mit der Angiektasie zu verwechseln, wenn letztere, und zwar die erworbene, ihm nach manchmal vorausgeht, z. B. beim Blutschwamme der Knochen die Erweiterung der Arterien der Beinhaut, bei dem Blutschwamme der Glandula thyreoidea die Erweiterung aller Arterien dieser Drüse, beim Blutschwamme des Auges die Varicosität der Choioidea (Cirsophthalmia), auch unter der Form des Pterygium scleroticum racemosum. Wenn es in solchen Fällen zur Blutschwammbildung kommen soll, so muß die Reizung fortdauern, es muß sich das Bindegewebe zu gefälsreichen Bälgen potenziren und in diesen Blut enthalten seyn. Umstände, welche bei der Angiektasie nie Statt finden.

§. 3.

2. Fungi der Schleimhäute.

Villositas, Status villosus, Excrescentiae fungosae, Carunculae, Schwämme, Schwammgewächse der Schleimhäute).

Die Gefäßerweiterung der Schleimhäute ist höchst selten angeboren. Die später entstandene heißt man im geringeren Grade und wenn sie mehr über eine Schleimhaut verbreitet ist, fungöse Auflockerung (Fungositas), im höheren, wenn sie mehr partiell, gestielt ist, fungöser Auswuchs (Excrescentia fungosa, oder selbst Fungus). Die oberflächlichsten und feinsten Gefäße der Schleimhaut sind in beiden Fällen entwickelter, daher die Schleimhaut röther, sammtartiger, gelappter; ja im höchsten Grade, bei den eigentlichen Fungis, setzen sich die Ge-

fäße mehrere Linien, bis zu einem Zolle büschel- und quastenförmig fort und bilden weiche, ungleiche, fleischförmige, blaß-, oder hochrothe, mit Gefäßen durchzogene, faserige, dem Mutterkuchen ähnliche, Auswüchse. Am häufigsten kommen diese Schwämme in der Harnblase vor *), wo sie Schleim- und Blutabgang nebst Harnbeschwerden verursachen. Um diese Auswüchse können sich aus dem Harne Salze ablagern, wodurch dann ein angewachsener Stein entsteht. Aehnliche, jedoch kleinere, Auswüchse kommen im Darmkanale, besonders bei nervösen Fiebern vor. Andral's rothe und braune kugelförmige Vegetationen, die vier bis fünf Linien hoch werden und die Manche, z. B. Lermnier, zu den innern Exanthenen rechnen, gehören hierher. Ebenso ist hierher zu zählen die *Epulis fungosa*, eine gefäfsreiche Wucherung der Schleimhaut und des Zahnfleisches in Folge von chronischer Entzündung der Beinhaut des Unterkiefers. Ferner Tott's periodische, dem Fungus haematodes ähnliche, Geschwulst an der Zungenwurzel bei einem 15jährigen Mädchen, wahrscheinlich als anomale Prodroma menstruationis (v. Graefe's und v. Walther's Journal d. Chir. Bd. XXIII. Heft 3. Seite 507.)

An den Augen selbst kommen aber ähnliche Zustände ebenfalls vor. Hierher gehören:

*) Eine höchst interessante Abbildung der Art in der Urinblase hat Hr. Professor Jäger in seinen Vorlesungen gezeigt, und nach ihm hat Professor Schönlein mehrere Fälle beobachtet, wo sich einzelne Gefäße in der Gegend der Prostata aus der Schleimhaut erhoben und reines arterielles Blut vergossen.

a) die *Encanthis fungosa*,

b) *Fungositas Conjunctivae*

oder die *Exophthalmia fungosa* (Beer).

Die *Conjunctiva scleroticae* ist hier dunkelroth, livid, sehr aufgelockert, so daß sie einzelne längliche Blätter bildet und zwischen die Augenlieder hervortritt und nicht selten einen Theil der Cornea bedeckt. Dieser Zustand ist theils ein begleitendes Symptom vieler Augenblennorrhöen, theils die Folge chronischer rheumatischer, oder gichtischer Entzündungen der Sclerotica, die mit dem Fungus haematodes nicht verwechselt werden können und gewiß sehr selten in ihn übergehen.

c) *Condylomata iridis*.

Kleine rothbraune Knötchen von der Gröfse eines Nadelknopfes, bis zu der einer kleinen Erbse sollen am Ciliar-, oder am Pupillarrande des Iris sitzen und Symptome einer Iritis syphilitica chronica seyn. Sie sind den Condylomen an der äusseren Haut zu vergleichen.

§. 4.

3. *Fungus ulceris sive ulcus fungosum*.

Was die Fungosität der Schleimhäute ist, ist der *Fungus ulceris*, nämlich eine krankhafte Auflockerung der Fleischwärzchen (Granulationen), die bekanntlich blos aus entzündetem Zellstoffe bestehen, d. h. aus einem höchst feinen Zellgewebe, mit vielen Arterien durchzogen und mehr oder weniger mit coagulabler Lymphe infiltrirt.

Fälschlich heist man diesen *Fungus ulceris*, wenn

er bei Caries, bei Nekrosis, kurz bei jedem anhaltenden Reize der Wunde einer eiternden Stelle, einen beträchtlichen Umfang erreicht, *Fungus haematodes*, wie z. B. Bona in v. Graefe's und v. Walther's Journal Band VIII. Heft I. Seite 69. Der Grund, oder die Ränder eines Geschwüres sind mit schlaffen, weichen, blafsrothen, oder violetten blumenkohlähnlichen und leichtblutenden Granulationen besetzt, die man wildes Fleisch, *Caro luxurians*, nennt, wenn sie nicht sehr erhaben sind und einen grossen Theil der Oberfläche einnehmen, *Fungi* hingegen oder *Excrementiae fungosae*, wenn sie längliche, oder kugelige, gestielte, blumenkohlähnliche Auswüchse bilden. Letztere kommen auch bei den eiternden Wunden der sogenannten Bluter vor. Durch die specifische Eigenschaft des Tripperschleimes, oder des syphilitischen Eiters, entstehen auf der Haut, am After, an den Schaamlippen, an den Schenkeln und am Hodensacke oberflächliche Exulcerationen, die wenig eitern, nicht in die Tiefe gehen, sondern in die Höhe und *Condylome*, *Ulcera condylomatosa*, *Ulcera syphilitica fungosa* genannt werden.

§. 5.

4. Carcinoma.

Der Krebs ist die Anschwellung eines Theiles, welche in Folge einer allgemeinen Säfteentmischung sich bildet und in der Ablagerung einer eiweiss- und speckartigen Substanz in das Gewebe eines drüsigen Theiles besteht, nur sehr wenige feine Blutgefässe enthält, die aber endlich sich vermehren und durch entzündliche Erweichung den Aufbruch der Geschwulst

mit beständiger Verschwärung veranlassen. Es können sich aus diesem speckartigen Gewebe nie kräftige Granulationen bilden, sondern es erscheinen blumenkohlähnliche, leicht blutende, ein scharfes, stinkendes Serum absondernde, Schwämme, welche oberflächlich absterben, abfallen, sich aber eben so schnell wieder erzeugen. Diese Schwämme sind ebenfalls nur eine Ausartung der Granulationen und auch sie werden fälschlich Blutschwamm genannt.

Der wahre Krebs des Augapfels kommt primär nie vor. Was man so nennt, ist Ophthalmitis rheumatica, oder traumatica, die reizend behandelt wurde und einen Exophthalmus fungosus veranlasste. Beim Durchschnitt des exstirpirten Augapfels findet man die Augenflüssigkeiten in ein entzündetes, fleischähnliches Gewebe verwandelt. Oder es ist Mark-, oder Blutschwamm, oder endlich Ophthalmitis des Augapfels in Folge der Weiterverbreitung des Krebses der Augenlieder.

§. 6.

5. Markschwamm.

Er ist ein in jedem, besonders aber im kindlichen und im mittleren, Lebensalter und in allen Theilen möglicherweise vorkommendes Gewebe, welches sich durch grössere Weichheit und größeren Gefäßreichthum vom Krebse unterscheidet und eine auffallend physische und chemische Aehnlichkeit mit der Gehirnmasse hat. Er scheint durch eine anomale und dyskrasische Eiweißsecretion aus den serösen und fibrösen Häuten zu entstehen. Auch er zeigt in seinem 2ten Stadio, d. h. nach seinem Aufbruche nach

er bei Caries, bei Nekrosis, kurz bei jedem anhaltenden Reize der Wunde einer eiternden Stelle, einen beträchtlichen Umfang erreicht, *Fungus haematodes*, wie z. B. Bona in v. Graefe's und v. Walther's Journal Band VIII. Heft I. Seite 69. Der Grund, oder die Ränder eines Geschwüres sind mit schlaffen, weichen, blafsrothen, oder violetten blumenkohlähnlichen und leichtblutenden Granulationen besetzt, die man wildes Fleisch, *Caro luxurians*, nennt, wenn sie nicht sehr erhaben sind und einen grossen Theil der Oberfläche einnehmen, *Fungi* hingegen oder *Excrecentiae fungosae*, wenn sie längliche, oder kugelige, gestielte, blumenkohlähnliche Auswüchse bilden. Letztere kommen auch bei den eiternden Wunden der sogenannten Bluter vor. Durch die specifische Eigenschaft des Tripperschleimes, oder des syphilitischen Eiters, entstehen auf der Haut, am After, an den Schaamlippen, an den Schenkeln und am Hodensacke oberflächliche Exulcerationen, die wenig eitern, nicht in die Tiefe gehen, sondern in die Höhe und *Condylome*, *Ulcera condylomatosa*, *Ulcera syphilitica fungosa* genannt werden.

§. 5.

4. Carcinoma.

Der Krebs ist die Anschwellung eines Theiles, welche in Folge einer allgemeinen Säfteentmischung sich bildet und in der Ablagerung einer eiweiss- und speckartigen Substanz in das Gewebe eines drüsigen Theiles besteht, nur sehr wenige feine Blutgefässe enthält, die aber endlich sich vermehren und durch entzündliche Erweichung den Aufbruch der Geschwulst

mit beständiger Verschwärung veranlassen. Es können sich aus diesem speckartigen Gewebe nie kräftige Granulationen bilden, sondern es erscheinen blumenkohlähnliche, leicht blutende, ein scharfes, stinkendes Serum absondernde, Schwämme, welche oberflächlich absterben, abfallen, sich aber eben so schnell wieder erzeugen. Diese Schwämme sind ebenfalls nur eine Ausartung der Granulationen und auch sie werden fälschlich Blutschwamm genannt.

Der wahre Krebs des Augapfels kommt primär nie vor. Was man so nennt, ist Ophthalmitis rheumatica, oder traumatica, die reizend behandelt wurde und einen Exophthalmus fungosus veranlasste. Beim Durchschnitt des exstirpirten Augapfels findet man die Augenflüssigkeiten in ein entzündetes, fleischähnliches Gewebe verwandelt. Oder es ist Mark-, oder Blutschwamm, oder endlich Ophthalmitis des Augapfels in Folge der Weiterverbreitung des Krebses der Augenlieder.

§. 6.

5. Markschwamm.

Er ist ein in jedem, besonders aber im kindlichen und im mittleren, Lebensalter und in allen Theilen möglicherweise vorkommendes Gewebe, welches sich durch grössere Weichheit und größeren Gefäßreichthum vom Krebse unterscheidet und eine auffallend physische und chemische Aehnlichkeit mit der Gehirnmasse hat. Er scheint durch eine anomale und dyskrasische Eiweißsecretion aus den serösen und fibrösen Häuten zu entstehen. Auch er zeigt in seinem 2ten Stadio, d. h. nach seinem Ausbruche nach

festen, beim Schneiden glänzenden, schwarzbraunen Masse verwandelt, welche aus einem sehr feinen Zellgewebe ohne Spur von Gefässen besteht, in denen man nur noch fibröse Reste der Sclerotica und der Kapsel bemerkt, und die beim Zerdrücken auf das Papier dasselbe rothbraun färbt.

§. 8.

7. Blutgeschwulst.

(Haematoma, Haematococcus, Tumor sanguineus, Ecchymosis).

Sie ist eine Ansammlung von Blut, gewöhnlich in Folge von Zerreißen der Gefäße, oder von Ergießung des Blutes auf der Höhe von Entzündungen, welche nur eine vorübergehende Dauer hat und in der Regel von keiner Dyskrasie abhängt, daher auch keine Recidive erleidet. Das Cephaloematoma der Neugeborenen ist eine solche Blutergießung zwischen die, noch unvollkommen und häutig gebildete äussere und die normale innere Platte des Scheitelbeines. Die noch fehlende äussere Platte wird durch die Beinhaut vertreten. Diese erhebt sich daher als fluctuirende Geschwulst und an ihrem Umfange fühlt man einen knöchernen Rand, welches der Rand des gesunden Knochens ist. Zwischen dem schon gebildeten Theile dieser Platte und der Beinhaut ist Blut ergossen, das allmählig resorbirt wird, wobei die schon gebildete Knochenplatte allmählig einsinkt und in der, die Stelle der nicht gebildeten Knochenplatte vertretenden, Beinhaut sich allmählig Knochen-schuppen bilden. Daher fühlt man auch nach der Zertheilung der fluctuirenden Geschwulst eine An-

Schwellung des Knochens, oder einen deutlichen Knochenrand. Beides habe ich in der chirurgischen Klinik des Herrn Professor Jäger nicht bloß während des Lebens beobachtet, sondern auch durch die anatomische Untersuchung nachgewiesen gefunden. In anderen Fällen veranlaßt die Knochenbildung der Beinhaut beim Druck einen Ton, dem ähnlich, welchen dünne metallene Gefäße beim Drucke von sich geben; was Chelius beobachtet hat. Auch die Blutgeschwülste, namentlich die der Neugeborenen, hat man mit Unrecht in das Gebiet der Angiektasien und des Fungus haematodes gezogen.

Auch am Auge kommen Haematome vor; wirkliche erbsen-, oder bohnergroße Blutansammlungen unter die Conjunctiva, theils in Folge von Quetschungen, theils in Folge von Erschütterungen, z. B. bei der Tussis convulsiva, aber auch spontan beim Scorbut. Es giebt aber auch Blutergießungen in die vordere Augenkammer (Haemophthalmia), und zwar sowohl traumatische bei Ruptura iridis (Iridodialysis traumatica) in Folge von Quetschungen, als spontane, nämlich entzündliche bei heftigen Ophthalmien, z. B. der scrophulösen, oder paralytische, z. B. beim Scorbut. Das flüssige Blut in beiden Fällen wird allmählig resorbirt.

§. 9.

8. Blutschwamm.

Der wahre oder idiopathische Blutschwamm (Fungus haematodes) ist eine von den bisher geschilderten Krankheiten wesentlich verschiedene, die in einer krankhaften Gefäßentwicklung und Bildung gefäßrei-

cher Zellen besteht, in welche Blut abgesondert wird, wodurch das Ganze einem mit Blut getränkten Schwamme gleicht. Die ursprüngliche Bildung des Blutschwammes scheint vorzüglich von den serösen und fibrösen Häuten auszugehen. Die Gelegenheitsursachen sind anhaltende Congestionen und Reizungen, besonders aber chronische Entzündungen, theils in Folge mechanischer Einwirkungen, theils in Folge von Verkältungen, besonders aber bei gleichzeitiger Haemorrhoids und Gicht. Es bildet sich daher unter den Symptomen der chronischen Reizung, oder Entzündung allmählig eine mehr, oder weniger bläuliche und fluctuirende Geschwulst, die nach dem künstlichen, oder natürlichen Aufbruche Blut entleert und ebenfalls von sogenannter Schwammbildung begleitet ist. Die Blutungen aus diesen Schwämmen, ihr Absterben, ihre Gröfse sind aber hier hedeutender. Wenn sich noch nicht früher constitutionelle Symptome entwickelt haben, so treten sie nun in der Regel hier bald auf mit allen Zeichen der Säfteentmischung. Die anatomische Untersuchung zeigt nichts von dem, was man bei den früher angeführten Afterorganisationen bemerkt, nämlich keine speck-, oder hirnartige Materie, keine melanotischen Massen, kein spongiöses, erectiles Gewebe, keine Gefäfsconvolute, sondern gröfsere und kleinere Kisten von verschiedener Dicke ihrer Wände, die neben- und in einander liegen und nicht selten von einem gemeinschaftlichen Balge umgeben sind. Die Dicke dieser Wände variirt von der feinsten serösen Haut, bis zu der der gewöhnlichen Beinhaut. Sie sind mit mehr, oder weniger flüssigen, oder halbconsistenten Blute gefüllt.

Die scheinbaren Coagula bestehen selbst wieder aus sehr zartem, mit Blut gefüllten, Zellstoffe. Wenn bei der Speckgeschwulst und bei dem Krebse eine mehr speckähnliche, halbknorplige Masse, beim Markschwamme eine dem Hirne ähnliche, eiweißartige Substanz und bei der Melanosis Pigment aus dem Blute in das Gewebe abgesondert wird, so wird hier in Folge eines mechanischen, oder dynamischen Reizes aus dem entzündeten Zellgewebe, das sich zu Bälgen potenzirt, Blut abgesondert, welches bei allgemeiner Dyskrasie qualitativ verändert seyn kann.

Da ein anderer Zuhörer des Herrn Professor Jaeger über den Blutschwamm ausführlich abhandelte *), so kann ich auf jene Abhandlung verweisen, in der die bisherigen Beobachtungen dieser Afterorganisation in den verschiedenen Geweben des Körpers aufgezählt sind.

§. 10.

Der wahre Blutschwamm des Auges.

Dieser ist bis jetzt noch sehr selten beobachtet worden. Die unter dem Namen Fungus haematodes aufgeführten Fälle sind offenbar größtentheils Markschwämme mit der secundären Schwammbildung. Doch mag mancher für Markschwamm, oder für Melanosis, oder für Krebs erklärte Fall ein wahrer Blutschwamm gewesen seyn. Da aber die anatomischen

*) Schaffner über den wahren Blutschwamm. Würzburg 1834. 4. Mit einer illuminirten Kupfertafel.

Charaktere selten genau angegeben sind, da ferner die Handbücher den Blutschwamm noch als eine und dieselbe Krankheit mit dem Markschwamme abhandeln, so liegen bloß folgende Beobachtungen vor:

A) v. Walther *) beobachtete mehrere.

Nach ihm fängt der Blutschwamm meistens in der Conjunctiva an, und zwar bilden sich zuerst kleine schwammige Auflockerungen, die sich nach und nach in wirkliche Auswüchse verwandeln. Zuweilen, aber selten, entwickelte sich der Schwamm auch aus einem Knötchen, welches lange Zeit mit wenigen Beschwerden getragen, endlich aber ulcerirt wurde, und welches eine mit schwammigen Auswüchsen besetzte Geschwüresfläche bildete. v. Walther sah einen Fall, wo ein sehr großer, weit in die Augenhöhle hineinragender, die ganze vordere Fläche des Augapfels überziehender, oft und stark blutender, oberflächlich ulcerirter Fungus bloß in der Bindehaut der Sclerotica und in dem Bindehautblättchen der Cornea wurzelte, die unterliegenden Augenhäute aber gesund waren. Er sah ferner, daß die fungöse Entartung von der Conjunctiva ausgehend, bereits die Augenhäute an der vorderen Halbkugel des Augapfels, die Cornea, die Iris und den Ciliarkörper zerstört hatte, indem die hinteren Theile des Augapfels noch gesund und unverändert waren. Endlich beobachtete er einen Fall, wo die fungöse Entartung vom Augenhöhlende begann, mehrere Jahre hindurch sich

*) Journ. der Chir. und Augenheilk. B. V.

auf eine kleine Strecke am Rande des oberen Augenlides beschränkte, endlich aber sich über die innere Augenliedhaut und über den Augapfel selbst verbreitete. Dieser war nun in seinen Halbkugeln gänzlich entartet, und nachdem ihn v. Walther exstirpirt hatte, fanden sich noch degenerirte Orbitalgebilde, welche gleichfalls einzeln hinweggenommen werden mußten. In einzelnen Fällen kann der Krankheitskeim auch tiefer sitzen und den Augenhäuten der tieferen Schichten eingepflanzt seyn. Allein v. Walther glaubt, daß in diesem Falle die krankhafte Metamorphose von dem Gefäßsysteme des Augapfels und nicht von der Netzhaut, oder dem Sehnerven ausgehe. Immer haben alsdann längere Zeit vor dem wirklichen Eintritte der fungösen Entartung Gefäßverweiterungen im Inneren des Augapfels, Verdünnungen der Sclerotica, staphylomatöse Auftreibungen derselben u. s. w. bestanden. In einem Falle sah v. Walther den Augenschwamm sich aus einer Augapfelwassersucht entwickeln, wobei der Bulbus durch die übergroße Ausdehnung und Verdünnung der Augenhäute geborsten war, und aus den Wundrändern der Berstung, welche sich nicht wieder vereinigten, der Fungus hervorwucherte.

B) Herr Professor Jäger beobachtete folgenden Fall *):

Ein 3½ jähriges Mädchen von zarter, scrophulöser Constitution bekam im 6ten Monate seines Alters convulsivische Bewegungen der Extremitäten, Verdrehen der Augen, Bohren mit dem Kopfe im Kissen

*) Schaffner a. a. O. pag. 16.

und bald darauf einen Ohrenfluß, der etwa $1\frac{1}{2}$ Jahr dauerte, sich allmählig verlierend. Darauf bemerkte die Mutter am linken Auge Verfärbung der blauen Iris mit Erweiterung der Pupille, und es kam ihr vor, als ob eine helle Wasserblase sich aus derselben hervordränge. Das Weiße des Auges war dabei nicht entzündet, und das Kind scheint noch Schein auf diesem Auge gehaht zu haben. Die Anwendung von Vesicantien und Abführungsmitteln war ohne Erfolg, das Auge wurde vielmehr geröthet, und allmählig dunkelblau, besonders auf den Gebrauch einer starken Augensalbe. Im Mai 1833 brachte die Mutter das Kind in die chirurgische Klinik. Man fand die Augenlieder etwas geröthet und geschwollen, die Conjunctiva palpebrarum gleichmäfsig roth, den Augapfel beinah um das Doppelte vergrößert, hügelig und blauroth, von der Cornea war nur in der Mitte eine etwas durchsichtige Stelle zurückgeblieben, hinter der man 2 ovale dunkle Punkte bemerkte, um die sich ein gelblicher Kreis zog, der 10 Tage vorher einen goldgelben Schimmer gehabt haben soll. Die Sclerotica war in 6 grofse kugelige Wülste ausgedehnt, wovon sich der gröfste nach unten und aussen befand. Die blauen Wülste waren mit ausgedehnten Gefäfsen der Conjunctiva bedekt *). Dieser Zustand der Sclerotica soll damals seit etwa 6 Wochen bestanden haben. Einige Tage später barsten die Wülste; einige entleerten eine gelbliche Flüssigkeit, andere Blut mit Eiter gemischt, wodurch der Augapfel sich bedeutend verkleinerte. Bald nahm er aber unter

*) Siehe fig. 1. der Abbildung.

Schmerzen und Hitze im Kopfe und Lichtscheu des anderen Auges wieder zu, so daß er am 25sten Juni die GröÙe eines Borsdorfer Apfels erreicht hatte. Der äussere Theil des von einzelnen, mit schwarzen Blutcrusten bedeckten, Wülsten gebildeten Augapfels *) hatte ein granulirendes Ansehen, dabei zeigten sich Lichtscheu, Kopfschmerzen, Durst, Mangel an Appetit und febrilische Erscheinungen. Die Krankheit wurde für Fungus haematodes in Folge chronischer scrophulöser innerer Augenentzündung erklärt und am folgenden Tage zur Extirpation geschritten. Der vordere Theil der Geschwulst war mit einer dicken Blut- und melanotischen Cruste überdeckt, welche an einzelnen Stellen 3 — 4 Linien dick war und die Härte von weichem Leder hatte. Das Innere des Auges bestand aus schwarzem geronnenen Blute mit einzelnen fibrösen Fächern und Zellen. Die Kranke verließ vor der Heilung am 4ten Juli die Klinik. Damals war seit einigen Tagen die Parotis angeschwollen, und man befürchtete die Bildung eines Fungus daselbst.

C) Unger **) beobachtete einen von der Conjunctiva ausgehenden Fungus haematodes, der in der, einem Werkchen beigegebenen, Abbildung einige Ähnlichkeit mit dem hat, welchen ich habe abbilden lassen. Da dieser Fall leicht von Augenärzten übersehen werden könnte, so füge ich ihn hiemit bei:

*) Siehe fig. 2.

**) Observationum clinicarum fasciculus I. Zwicaviae 1835. pag. 37.

J., ein Zimmermann, ersuchte mich vor 5 Jahren um meinen ärztlichen Rath und bat mich, ihn von einem Uebel, daß er am Auge habe, zu befreien. Ich fand das rechte Auge vollkommen gesund, das linke dagegen zeigte einen Auswuchs, welcher durch das Schließen der Augenlider weder gänzlich bedeckt, noch verborgen werden konnte. Diese Wucherung war von einem schwammigen, mehr härtlichen, als weichen Gewebe, von einer dunklen, schwarzbläulichen, mehr veilchenähnlichen, als lividen Färbung; die Form war kuglig, ihr Umfang nicht gleichmäßig, sondern sie hatte auf ihrer Oberfläche Einschnitte und war von einer dünnen, einer serösen nicht unähnlichen, Umhüllung eingeschlossen. Von der Geschwulst rannen oft wälsrig - blutige Tropfen über die Wangen, jedoch zeigten sich diese nur bei einer leichten Berührung mehr geröthet und wahrhaft blutig. Im innern Augenwinkel fand sich eine schleimige Feuchtigkeit vor, die aber reichlicher und zäher, als beim gesunden Zustande des Auges war. Die Bindehaut war ausserhalb der Grenzen der Geschwulst verdichtet und mit Blut unterlaufen. Der Auswuchs selbst hing aber so fest an dem Augapfel, indem er den größten Theil der Sclerotica und Cornea bedeckte, daß die Gonjunctiva dieser beiden Membranen dem Finger, welcher irgend eine Bewegung versuchte, gar nicht nachgab. Das schwammige Gebilde ging oben bis zu der Falte, wo die Gonjunctiva von dem Augenlide zum Bulbus kommt, unten jedoch erstreckte es sich nicht so weit, sondern es hing über dem Augenlide frei nach aussen hervor. Wenn man beide Augenlider zurückzog, konnte man deutlich

begrenzt und umschrieben die krakhafte Masse sehen. Die Iris zeigte sich im rechten gesunden Auge bläulich, im anderen kranken aber verdunkelt, jedoch am inneren Halbkreise unter der Wucherung mehr gebräunt, als am äusseren, wo sich die Beschaffenheit derselben weniger von der der gesunden unterschied. Wenn man sie aber am inneren Kreise von der Seite und von der Queere betrachtete, so fand man sie geschwollen, daß sie sich, gleichsam varicös, der Cornea annäherte, während jedoch der Kreis der Pupille weniger, als man glauben sollte, eckig und seines natürlichen Pigmentes beraubt war. Die Sehkraft war, obgleich nicht völlig erloschen, doch sehr gering. Das Auge schmerzte nicht einmal bei der Berührung, jedoch fand oft heftiger Kopfschmerz und eine lästige Hitze auf der Stirne Statt.

Was ich über den Ursprung des Uebels erfahren konnte, war wesentlich Folgendes:

An dem Manne, dessen Bruder im Vorbeigehen gesagt, an einer Cataracte beider Augen leidet, ist durchaus kein Zeichen einer Kachexie oder Dyskrasie bemerkbar, und derselbe erinnert sich auch nicht, daß sein Auge je durch eine äussere Gewaltthätigkeit gelitten habe; vor etwa 6 Jahren sprang ihm zwar über seiner Arbeit ein Stück Holz an die Stirne, er fühlte aber davon durchaus keine Beschwerde. Es behauptet der Kranke, daß der Ursprung seines Leidens von einem Knötchen herzuleiten sey, welches vor etwas über 2 Jahren im Augapfel, wenn wir der Aussage des Mannes glauben sollen, nahe an der Cornea und am Rande der Sclerotica zum Vorschein gekommen sey, ohne daß dadurch weder

das Gesicht beeinträchtigt, noch seine Gesundheit im Mindesten gestört worden wäre, mit Ausnahme von Kopfschmerzen, welche seit jener Zeit sich öfters wiederholten und zugleich mit Röthe des Auges und Blutunterlaufungen auftraten. Auf diese Beschwerden hat jedoch der Kranke, nach seiner Aussage, wenig geachtet, da sie nach einer Dauer von wenigen Tagen wieder verschwanden; aber nach einer Zeit von 6 Wochen stellten sie sich wieder ein, während jenes Knötchen an Gröfse kaum merklich zunahm. Schon vor 3 Monaten befiel den Kranken ein Fieber, das sich durch Schauer, Hitze und heftiges Kopfweh besonders bemerkbar machte, und während dieser Krankheit entwickelte sich das Augenübel und die Sehkraft wurde sehr bedeutend vermindert.

Da ich das Ergebnifs des ersten Krankenexamens, das ich so eben darlegte, kaum für hinreichend hielt, um eine sichere Diagnose zu begründen, so beschlofs ich dasselbe durch jenen Arzt zu ergänzen, dessen Behandlung sich der Kranke in der letzten Krankheit anvertraut hatte. Vorerst verschrieb ich ihm ein dünnes Bleiwasser zum Ueberschlagen und innerlich einen Trank mit Hallers-Sauer. Bald gelang es mir, dafs ich von jenem Arzte erfuhr, die Symptome der Krankheit seyen fast dieselben gewesen, welche bei der Febris nervosa lenta vorzukommen pflegten, jedoch habe es sich dem remittirenden Typus mehr genähert, woher es auch kam, dafs die Hoffnung auf baldige Genesung öfters täuschte und die Krankheit sich in die Länge zog, welche bald sehr gelind war, bald mit Ergriffenseyn des Kopfes, mit einem neuen

Anfalle von Frost exarcebirte. Die Beschaffenheit des Auges während der Krankheit wurde mir so geschildert, als ob zwischen der Cornea und Sclerotica aus den inneren Theilen eine schwarze Pustel hervorgebrochen, welche mit Blutgefäßen durchwebt und davon überzogen wäre. Da aber alle Entzündung der übrigen Theile des Auges fehlte, so wurden auch keine örtlichen Arzneien gebraucht.

Einige Wochen nachher hatte ich Gelegenheit, das Krankenexamen zu wiederholen, und der Kranke rühmte sehr meine neulich verschriebenen Arzneien, wodurch sich die Schmerzen und die Hitze im Kopfe gelegt hätten. Ich fand die Geschwulst ein wenig größer, das Sehvermögen war so, daß er gebrochenes Licht bloß durch das Gefühl unterscheiden konnte. Ich ließ den Gebrauch der Arzneien aussetzen. Aber nicht lange, so ging Alles schlimmer, es entstanden heftige Schmerzen in der schwammigen Geschwulst mit einem drückenden Gefühle. Nachdem durch Aderlässe und Blutigel hinlänglich Blut abgelassen war und der Schmerz darauf nachließ, vertauschte ich das Bleiwasser mit Opiumtinctur, wodurch das Fortwachsen der Wucherung vielleicht verzögert, ihre Größe keinesweges aber vermindert ward. Die Beobachtungen von Hauk, einem sehr erfahrenen Arzte auf der Universität Warschau, über das salzsaure Zink, in Rust's Magazin Bd. XXII. bekannt gemacht, worin die große Wirksamkeit dieser ungewöhnlichen Arznei gegen Angiectasie und Blutschwamm gerühmt wird, brachten mich zu dem Entschlusse, einen Versuch damit zu machen; aber da dieses Mittel in den Apotheken nicht zu haben war

und nach meiner Vermuthung die Wirksamkeit desselben der blutstillenden, ätzenden Kraft zuzuschreiben seyn möchte, so beschloß ich statt des gerühmten Arzneimittels, das nicht minder wirksame schwefelsaure Kupfer anzuwenden, und trug es, mit Fett abgerieben, sehr vorsichtig auf den äussersten Theil der Geschwulst auf. Der ganze Erfolg dieses zweimal wiederholten Versuches war der, daß bei vorübergehender Reizung des Auges und geringem Schmerze die bestrichene Stelle eine Cruste überzog, und als diese wegfiel, war der Zustand des langsam wachsenden Schwammes ganz der frühere.

Warum sollte ich nicht bekennen, daß mir das Wesen der Wucherung in anatomischer und nosologischer Beziehung sehr zweifelhaft war? Während man beim ersten Anblick die Krankheit für einen Blutschwamm ansprach, wurde doch bei genauerer Prüfung diese Diagnose zweifelhaft und ungewiß, da weder das Alter des Kranken, noch der keinesweges schwache Gesundheitszustand, noch der Inhalt der Symptome dafür sprach. Aber die größte Verschiedenheit zwischen dieser Krankheit und dem Blutschwamme stellt sich vorzüglich heraus, wenn wir dem Ausspruche der meisten Schriftsteller gemäß, dem Markschwamme eine und dieselbe Entstehung geben wie dem Blutschwamme. Darüber waren wir wenigstens bald im Reinen, daß ein Gebild von Nerven oder Neurilem unserer Afterorganisation weder Grund, noch Entstehen gegeben habe, sondern daß dieselbe von einer Entartung des Gefäßsystems herzuleiten sey. Und es giebt allerdings sehr gelehrte Männer, von denen ich nur eines einzigen


unter unseren Zeitgenossen, des berühmten Langenbecks, Erwähnung thun will, welche den Unterschied zwischen Mark- und Blutschwamm so festsetzen, das letzterer vorzüglich reich an Gefäßen, namentlich an Capillargefäßen ist. Ja noch mehr! v. Walther, der Mann von unvergleichlicher Gelehrsamkeit, welcher diese Fragen sehr eifrig behandelte, giebt, obgleich er jenem Unterschiede nicht beitrifft, die Erklärung, daß einem jeden schwammigen Aftergebilde Gefäßerweiterung zum Grunde liege und ein und dieselben Bestandtheile zukommen, welche aus Zellgewebe, verlängerten und neugebildeten Gefäßen mit darunter gemischter parenchymatöser Substanz bestünden und vom Blut secrenirt seyen. Nach seiner Behauptung hat die Krankheit am häufigsten ihre Entstehung in der Bindehaut des Auges, obgleich bisweilen auch in den übrigen inneren Membranen der Keim dazu liegen kann. Und Jüngken, welcher die Auszeichnung und den Ruf verdient, den er sich unter den Augenärzten erworben, und der den Blutschwamm nur von der Iris herkommen sah, zeigt an, das eine kachecktische Schwäche des ganzen Körpers und eine besondere Verfallenheit und Verderbniß des Auges mit dem Uebel vereint sey. Da weder jene bei unserm Kranken offenbar war, noch letztere in den einzelnen Theilen des Auges sehr verbreitet schien, wie ich es bei dem doch schon veralteten Uebel erwartet hätte, so schob ich mein Urtheil über die Natur desselben und meinen Heilplan um so mehr auf, je weniger ich Gelegenheit hatte, entweder die Entstehung der Krankheit zu beobachten, oder die inneren, schon bedeckten Theile zu

untersuchen. Obgleich ich das Gewebe der Iris in die kranke Sphäre gezogen und ihren Rand am äusseren Augenwinkel krankhaft verändert, nämlich durch eine Gefässerweiterung angeschwollen sah, so konnte ich doch nicht umhin, dieses Ergriffenseyn eher für Fortschritte der Krankheit, als für idiopathisches Leiden zu erklären, und ich kam auf die Meinung, daß das vorliegende Uebel unter die Blutschwämme der Conjunctiva zu zählen sey. Obgleich ich nun dieses Räthsel glücklich gelöst zu haben glaubte, so war doch meine Hoffnung auf eine günstige Prognose um nichts besser, wenn ich nicht von den fruchtlos angewendeten Arzneimitteln zum Messer übergegangen wäre. So wie aber viele Gründe entgegenzustehen und zu verbieten schienen, den Blutschwamm, welcher mit der Sclerotica und Cornea innig verwachsen war, von diesen beiden Membranen zu trennen, eben so ist es gewiß auf der andern Seite eine sehr bedenkliche Sache, ein Organ zu zerstören, so lange, wenn auch nur eine geringe Hoffnung übrig bleibt, dasselbe zu erhalten. Diese zweifelhafte Lage der Dinge bewog mich einem Arzte an der Leipziger Universität, der nicht allein in der Beobachtung der Natur des Auges und seiner Zustände sehr erfahren, sondern auch sehr reich an einer Menge von Erfahrungen ist, den ganzen Stand der Sachen mit Beifügung der Abbildung vorzulegen, damit der scharfsinnige Mann meine Zweifel hebe. Er war so gütig gegen mich, mir auf mein Ansuchen bald seine Meinung über den Fall zu erkennen zu geben; „Er halte nach meiner Beschreibung und Zeichnung den Zustand für einen Blutschwamm der Conjunctiva und

sonder Zweifel würde ich genöthigt seyn, zur Exstirpation eines Theiles des Auges meine Zuflucht zu nehmen, aber, um die Verfahrungsart besser feststellen zu können, sey es wünschenswerth, daß er den Kranken selbst sehe.“ Da nun Letzteres nicht thunlich war, der Blutschwamm aber eine bedeutende GröÙe erreicht hatte, so daß er den inneren Rand der Sclerotica erreichte und die Cornea ganz einhüllte, so faßte ich den Entschluß, da auch die Härte immer zunahm, denselben mit dem vorderen Theile des Auges abzutragen, worüber ich lange in Zweifel war. Und ich verschob es deshalb nicht länger, da die GefäÙserweiterungen, welche von Tag zu Tag gröÙer und häufiger wurden und sich an der Conjunctiva des oberen Augenlides umbogen, endlich fürchten ließen, es möchte letzteres auch dadurch Schaden leiden. Es wurde also die Conjunctiva ausser den Grenzen der Varizen eingeschnitten, und nachdem man den vorderen Theil des Augapfels, worauf der Schwamm saß, abgetragen hatte, so zeigte derselbe sich nicht allein mit den Häuten des Auges so fest verwachsen, daß er nur durch Abschaben und Radiren weggenommen werden konnte, sondern es waren auch beide Häute, die Sclerotica und die Cornea, unter dem Schwamme sehr ausgedehnt. Obgleich ich weder die Textur beider irgendwo durchlöchert fand, noch irgend eine Spalte, oder ein kleines Loch zu entdecken war, so war doch die Iris und das Corpus ciliare am abgeschnittenen Stücke von ihrer natürlichen Bildung ganz verschieden und geschwollen, und boten eine homogene und gleichsam der fungösen ähnliche Masse dar. Nach

vollbrachter Operation wurde der Kranke, während die Natur bei der Heilung der Wunde thätig war, einigemale von nicht geringen Schmerzen befallen, besonders bei Nacht, und nach seiner Aussage durchzogen dieselben die Stirne und das ganze Haupt, waren auch den mit der Krankheit des Auges verbundenen so ähnlich, daß er sie für die Ueberbleibsel derselben hielt. Sie kehrten nach dem intermittirenden Typus wieder und ich milderte und stillte sie endlich durch Unguentum neapoltanum mit Opium und schwefelsaures Chinin, und möchte annehmen, daß sie aus einer Neuralgie der Retina entstanden und für analog jenen Schmerzen zu erklären wären, welche man nicht selten nach der Depression des Staares beobachtet. Denn bald hörten sie auf und befielen den Mann nicht mehr, welcher oft sein gutes Befinden bei mir rühmt und über eine Spur oder Ahnung des alten Uebels am rechten Auge nie wieder zu klagen hatte.

Die Erklärung der Abbildung siehe Seite 20 u. 21.






Fig. I.




Fig. II.



